



Discussione di un caso clinico all'interno del GOM: carcinoma
mammario HR+/Her2negativo, cT1c cN0
Discussione prechirurgia e postchirurgia

RCC
FOR PRES
12/01/2021, 09:05:43
Esame: oggetto SR CAD non disponibile

Density: ---
Angle: 7degs



ES BIOPSI

4cm Z





DESTRA QIE BIOPSIA

FOV: 237\177mm
S: 47
Z: 0,216
C: 8192
W: 10240



Discussione Pre - Chirurgia



14/04/2022 AMPIA ESCISSIONE SU CENTRAGGIO A DX E BLS OMOLATERALE



Esito istologico e discussione Post-Chirurgia



- Carcinoma infiltrante della mammella di tipo non speciale (NAS sec WHO 2019). Diametro massimo della componente infiltrante : mm 20; G2.
- Componente di carcinoma intraduttale: presente, < al 25% esteso oltre 1 mm dal margine della componente invasiva, di tipo cribriforme con atipie di grado basso, necrosi assente.
- Infiltrato linfocitario dello stroma intratumorale (TIL): pressochè assente.
- Invasioni vascolari: dubbie. Invasioni perineurali: non evidenti.
- Margini di exeresi: non evidenza di neoplasia in corrispondenza dei margini. Distanza minima tra carcinoma infiltrante e margine: 1 mm in corrispondenza del margine caudale . Radicalizzazione mediale indenne Radicalizzazione caudale indenne . Losanga di cute indenne .
- Linfonodo sentinella negativo ad esame estemporaneo e ITC al esame definitivo ; ulteriori linfonodi esenti da metastasi (0/2) .
- ANALISI IMMUNOISTOCHEMICA:
ER: 90% PgR: 80% Ki67: 20-25% E-caderina:+
HER2 : negativa.

GRUPPO INTERDISCIPLINARE TUMORI DELLA MAMMELLA

TRATTAMENTO PROPOSTO ORMONOTERAPIA,
RADIOTERAPIA

Terapia neoadiuvante No

CONCLUSIONI

Paziente di anni 62 in menopausa dall'età di 54 anni.
Considerate le caratteristiche della neoplasia si propone terapia adjuvante comprendente OT (AI) e RT.

IN ACCORDO CON LINEE GUIDA Si

Paziente è/sarà inserito in studio clinico? No

Paziente affidata/o a oncologia.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

