

Quesito GRADE

gruppo C

Nelle pazienti con recidiva locoregionale da carcinoma mammario, la chemioterapia dopo escissione chirurgica aumenta la sopravvivenza?

PIC..O

P → **Pazienti con recidiva
locoregionale da carcinoma
mammario**

I → **Chemioterapia**

C → **Osservazione**

Outcome

Votazione

• OS	8
• DSF	8
• QOL	6
• Morti tossiche	8
• Cardiotossicità	6
• Secondi tumori	6

Author(s):
 Date: 2014-03-21
 Question: Should chemioterapia vs osservazione be used in pz con recidiva locoregionale da carcinoma della mammella operato ?
 Settings: ospedale
 Bibliography: calor

Quality assessment							No of patients		Effect		Quality	Importance
No of studies	Design	Risk of bias	Inconsistency	Indirectness	Imprecision	Other considerations	Chemioterapia	Osservazione	Relative (95% CI)	Absolute		
Disease free Survival (follow-up median 4.9 years)												
1	randomised trials	no serious risk of bias ¹	no serious inconsistency	no serious indirectness	serious ²	none	24/85 (28.2%)	34/77 (44.2%)	HR 0.59 (0.35 to 0.99) ¹	151 fewer per 1000 (from 3 fewer to 257 fewer)	⊕⊕⊕○ MODERATE	CRITICAL
Overall Survival (follow-up median 4.9 years)												
1	randomised trials	no serious risk of bias	no serious inconsistency	no serious indirectness	serious ²	none	8/85 (9.4%) ²	18/77 (23.4%) ²	HR 0.41 (0.19 to 0.89)	130 fewer per 1000 (from 23 fewer to 184 fewer)	⊕⊕⊕○ MODERATE	CRITICAL
Morti tossiche - not reported												
1	-	-	-	-	-	none	-	-	-	-	⊕⊕⊕○ MODERATE	CRITICAL
cardiotoxicità - not reported												
1	-	-	-	-	-	none	-	-	-	-		IMPORTANT
QOL - not reported												
0	-	-	-	-	-	none	-	-	-	-		IMPORTANT

¹ basato su 162 ptz
² sample size non raggiunto x basso accrual
³ basato su stima di O-E e varianza
⁴ pochi eventi a ampi intervalli di confidenza

Bilancio rischio beneficio

INCERTO -unanime

- nessuna informazione utile su eventi avversi
 - in appendice erano riportati solo i SAE
- l'effetto del trattamento è significativo ma impreciso
- ipotizzabile una importante selezione delle pazienti

Forza della raccomandazione

POSITIVA DEBOLE -unanime

Raccomandazione

- Nelle pazienti con recidiva locale da carcinoma mammario, la chemioterapia dopo escissione chirurgica potrebbe essere proposta