

QUESITO GRADE: nelle donne con carcinoma mammario operato N+ la chemioterapia a base di antracicline e taxani dose dense è raccomandabile rispetto alla modalità di trattamento convenzionale?

Bilancio rischi/benefici e formulazione della raccomandazione

Votazione del rapporto beneficio/danno



Votazione del rapporto beneficio/danno


- Segno fattori
- Numero fattori
- Peso fattori



Votazione del rapporto beneficio/danno

PESO


1. Importanza dell'outcome



Votazione del rapporto beneficio/danno

PESO


1. Entità dell'effetto relativa e assoluta



Votazione del rapporto beneficio/danno

PESO

1. Entità dell'effetto relativa e assoluta



Votazione del rapporto beneficio/danno

PESO

1. Qualità delle evidenze e precisione nella stima dell'effetto

OS - Moebus 2010 (follow-up median 62 months)

1	randomised trials	no serious risk of bias ¹	no serious inconsistency	no serious indirectness	no serious imprecision	none	114/641 (17.8%)	139/611 (22.7%)	HR 0.76 (0.59 to 0.97)	5 fewer per 100 (from 1 fewer to 9 fewer)	HIGH	CRITICAL
---	-------------------	--------------------------------------	--------------------------	-------------------------	------------------------	------	-----------------	-----------------	------------------------	---	------	----------

Votazione del rapporto beneficio/danno

Votazione bilancio Beneficio/Danno		
Favorevole	Incerto	Sfavorevole
7	0	0

Fino a che punto si può fidare nel fatto che la stima di beneficio/danno possa essere usata a favore/contro il raccomandare l'uso di un intervento?

- Qualità delle prove: MODERATA (*è probabile che ulteriori studi possano confermare o cambiare la fiducia nella stima di effetto*)

Formulazione della raccomandazione

Votazione forza raccomandazione			
Positiva forte	Positiva debole	Negativa debole	Negativa forte
6	1	0	0

Formulazione della raccomandazione

Votazione forza raccomandazione			
Positiva forte	Positiva debole	Negativa debole	Negativa forte
6	1	0	0

Nelle donne con carcinoma mammario operato linfonodi positivi candidate a chemioterapia gli schemi a base di antracicline e taxani dose dense dovrebbero essere proposti